



QUAIS IMUNOGLOBULINAS DISPONÍVEIS NO CRIE?

- ✓ IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTITETÂNICA (IGHAT)
- ✓ IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITEB (IGHAHB)
- ✓ IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA (IGHAR)
- ✓ IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIVARICELA-ZOSTER (IGHAVZ)



NÃO ESQUEÇA!!!

- Vacinação salva vidas, especialmente em pacientes imunodeprimidos;
- O momento certo é antes da quimioterapia ou radioterapia;
- Vacinas vivas não devem ser aplicadas durante a imunossupressão;
- Familiares e cuidadores também precisam estar vacinados;
- Imunoglobulinas podem proteger após exposições de risco;
- Cada paciente precisa de avaliação individual do esquema vacinal.
- A decisão deve ser conjunta entre médico e paciente.

**PARA DEMAIS DÚVIDAS,
CONSULTE SEU MÉDICO ESPECIALISTA.**



VACINAÇÃO DE PACIENTE ONCOLÓGICO

**TEM CÂNCER OU CONHECE ALGUÉM QUE TENHA?
ESSA INFORMAÇÃO É PARA VOCÊ!**

VACINAS SALVAM VIDAS

O Programa Nacional de Imunizações do Brasil (PNI), criado em 1973, é um dos maiores do mundo, com vacinas que, de acordo com seu calendário vacinal, protegem crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas.

Em 1993 foram criados os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), que são locais destinados ao atendimento de pacientes, imunodeprimidos ou não, com recomendações especiais de imunização.

Pacientes oncológicos podem receber as vacinas não disponibilizadas na Unidade básica de saúde (UBS) ou oferecidas em faixas etárias restritas, nestes locais.

POR QUE VACINAR?

A vacinação é uma das formas mais eficazes de proteção contra doenças infecciosas, e tem papel fundamental na assistência a pacientes em tratamento oncológico.

Esses indivíduos apresentam maior risco de complicações por infecções, devido à própria doença e aos efeitos da quimioterapia, radioterapia ou uso de medicamentos imunossupressores.

QUANDO VACINAR?

O ideal é que o paciente tenha seu esquema vacinal atualizado, logo após o diagnóstico da neoplasia, antes da introdução da terapêutica imunodepressora.

O esquema vacinal deverá ser atualizado, sempre que possível, até 14 dias antes do início da terapia imunodepressora.



ONDE VACINAR?

Para usuários que não residem em João Pessoa, procure a Unidade Básica de Saúde do seu município.

Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE)



Rua Carlos Gomes, 35 - Torre,
João Pessoa - PB, 58040-080



3255-8364

QUAIS VACINAS DISPONÍVEIS?

VACINAS DE DIFERIA, TÉTANO E PERTUSSIS (COQUELUCHE) - DPT/DT/DT/DTPA, PENTA ACELULAR E HEXA ACELULAR	VACINA DE POLIOMIELITE 1, 2, 3 INATIVADA
VACINA DE HEPATITE B	VACINA DE SARAMPO, CAXUMBA E RUBEOLA (SCR)*
VACINA DE VARICELA*	VACINA DE FEBRE AMARELA*
VACINA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	VACINA DE INFLUENZA (INATIVADA)
VACINA DE HEPATITE A	VACINA MENINGOCÓCICA C
VACINA DE HPV 4 (9 A 45 ANOS)	VACINA PNEUMO 13 / PNEUMO 23

***As vacinas destacadas de rosa só podem ser aplicadas antes do início do tratamento e se não houver doença que contraindique o uso de vacinas vivas (vacinas produzidas com bactérias ou vírus vivos enfraquecidos, porém sem capacidade de produzir a doença).

VACINAS PARA CONVIVENTES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

VACINA CONTRA POLIOMIELITE (VIP)

► Crianças < de 5 anos (considerar esquema de rotina 3 doses + 1 Reforço);

VACINA VARICELA ZOSTER (VZ)

► Pessoas a partir de 12 meses (se não já foi vacinado ou se não já teve catapora);

VACINA TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA)

► Pessoas a partir de 1 ano de idade devem tomar 2 doses independentemente da idade;

INFLUENZA (GRIPE)

► A partir de 6 meses de idade (dose anual)