

ANEXO I – Transtorno esquizoafetivo

PACIENTE: _____

O quadro abaixo descreve os sintomas necessários para preenchimento do **critério G1** (Transtornos de humor-afetivo) e definidores dos subtipos de transtorno esquizoafetivo, assinale com um **X** os critérios que o paciente apresenta:

	Critérios básicos	Tempo mínimo (dias)	Critérios adicionais
F25.0 Esquizo Maníaco ()	() Elevado/expansível/ Irritável e claramente anormal	7	Pelo menos 3 dos critérios abaixo (4 se humor irritável): () atividade aumentada/inquietação física; () loquacidade aumentada; () fuga de ideias/experiência de pensamentos acelerados; () perda de inibições/comportamento inapropriado; () diminuição da capacidade de sono; () autoestima infladagrandiosidade; () distratibilidade/mudança rápida de planos; () comportamento temerário/imprudente; () energia sexual marcante/indiscrição sexual.
F.25.1 Esquizo Depressivo ()	Pelo menos 2 dos critérios abaixo: () humor deprimido anormal; () perda de interesse/prazer; () energia diminuída.	14	Pelo menos 1 ou mais de: () perda de confiança ou autoestima; () sentimentos irracionais de auto-reprovação/culpa; () pensamentos de morte/suicídio/comportamento suicida; () queixas ou evidências de indecisão; () desatenção; () diminuição da concentração; () alteração psicomotora: agitação ou lentidão; () alterações do sono/apetite com alteração de peso
F 25.2 Esquizoafetivo Misto ()	Pelo menos 1 dos critérios abaixo: () sintomas maníacos e depressivos simultâneos. () sintomas maníacos e depressivos com alternância rápida.	14	Passado com pelo menos 1 dos critérios abaixo: () episódio afetivo maníaco; () hipomaníaco; () misto.

Continua na página 2

ANEXO I – Transtorno esquizoafetivo

O paciente apresenta os seguintes critérios gerais:

- **G2** - Os sintomas de, PELO MENOS UM DOS GRUPOS listados a seguir estão claramente presentes durante a maior parte do tempo por um período de, pelo menos, duas semanas:

	eco de pensamento, inserção ou retração de pensamento, irradiação de pensamento;
	delírios de controle, influência ou passividade claramente relacionados a movimento de corpo, de membros ou sobre pensamentos, ações ou sensações específicas;
	vozes alucinatórias que fazem comentários sobre o comportamento do paciente ou discutem entre si; ou outros tipos de vozes alucinatórias advindas de alguma parte do corpo (cabeça, tronco, mãos etc.);
	delírios persistentes de outros tipos que são culturalmente inapropriados e completamente impossíveis, porém, não meramente megalomaniacos ou persecutórios (por exemplo, visita a outros mundos, o poder de controlar as nuvens inspirando e expirando, o poder de comunicar-se com animais ou plantas sem precisar falar, etc.);
	fala totalmente irrelevante ou incoerente ou uso frequente de neologismos;
	surgimento intermitente, porém frequente, de algumas formas de comportamento catatônico, tais como postura inadequada, flexibilidade cérea e negativismo.

- **G3** - Os critérios G1 e G2 devem ser satisfeitos **dentro do mesmo episódio do transtorno e simultaneamente durante, pelo menos, algum tempo do episódio**. Sintomas tanto dos critérios G1 como dos G2 devem ser proeminentes no quadro clínico.

- **G4** - Os critérios de exclusão mais comumente utilizados consideram o fato de o transtorno não ser atribuível à doença cerebral orgânica, à intoxicação, à dependência ou abstinência relacionada a álcool ou outras drogas.

Assinatura e carimbo do médico

Data: ____ / ____ / ____.